

Simulare județeană
Examenul național de bacalaureat național 2022
Proba E.c)
Matematică M_mate-info

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$z = (3 + 2i)(3 - 2i) - (4 - i) = 3^2 - (2i)^2 - 4 + i = 9 + i$ Partea reală a numărului complex z este egală cu 9	2p 3p
2.	$f^2(2) = f(0)f(1) \Leftrightarrow (4 + a)^2 = a(2 + a) \Leftrightarrow a^2 + 8a + 16 = a^2 + 2a$ $6a = -16$, deci $a = -\frac{8}{3}$	2p 3p
3.	$2^{2x} - \sqrt{2} \cdot 2^x - 2 \cdot 2^x + 2\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow 2^x(2^x - \sqrt{2}) - 2(2^x - \sqrt{2}) = 0$ $\Leftrightarrow (2^x - 2)(2^x - \sqrt{2}) = 0$ $x = 1$ sau $x = \frac{1}{2}$	3p 2p
4.	Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri posibile Numerele naturale de două cifre care au produsul cifrelor mai mare decât 51 sunt 69, 96, 78, 87, 79, 97, 88, 89, 98 și 99, deci sunt 10 cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$	2p 3p
5.	B este mijlocul segmentului $AM \Rightarrow x_B = \frac{x_A + x_M}{2}$ și $y_B = \frac{y_A + y_M}{2}$, deci $M(7, -4)$ M este mijlocul segmentului $BN \Rightarrow x_M = \frac{x_B + x_N}{2}$ și $y_M = \frac{y_B + y_N}{2}$, deci $N(11, -7)$	2p 3p
6.	$2\sin x \cos x + 6\cos x - \sin x - 3 = 0 \Leftrightarrow 2\cos x(\sin x + 3) - (\sin x + 3) = 0 \Leftrightarrow$ $(\sin x + 3)(2\cos x - 1) = 0$ $\sin x + 3 \neq 0$, deci $\cos x = \frac{1}{2}$ și, cum $x \in (0, \pi)$, obținem $x = \frac{\pi}{3}$.	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 puncte)

1.a)	$A(2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(2)) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} =$ $= 8 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 8$	3p 2p
b)	$A(a)A(b) = \begin{pmatrix} 4 - 2a - 2b + 2ab & 0 & 2a + 2b - 2ab \\ 0 & 4 & 0 \\ 2a + 2b - 2ab & 0 & 4 - 2a - 2b + 2ab \end{pmatrix} =$ $= 2 \begin{pmatrix} ab - a - b + 2 & 0 & 2 - (ab - a - b + 2) \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 - (ab - a - b + 2) & 0 & ab - a - b + 2 \end{pmatrix} = 2A(ab - a - b + 2),$ <p>pentru orice numere reale a și b.</p>	3p 2p
c)	$A(pq - p - q + 2) = 2I_3 \Leftrightarrow A(pq - p - q + 2) = A(2) \Leftrightarrow pq - p - q = 0$ <p>Cum p și q sunt numere întregi, din $(p - 1)(q - 1) = 1$, obținem $p = 0$, $q = 0$ sau $p = 2$, $q = 2$.</p>	2p 3p
2.a)	$x * 1 = 2^{\ln x \cdot \ln 1} =$ $= 2^{\ln x \cdot 0} = 2^0 = 1, \text{ pentru orice } x \in G$	3p 2p
b)	<p>Legea este comutativă $x * f = f * x \Leftrightarrow 2^{\ln x \cdot \ln f} = 2^{\ln f \cdot \ln x}$</p> $x * f = x \Leftrightarrow 2^{\ln x \cdot \ln f} = x \Leftrightarrow \ln x \cdot \ln f \cdot \ln 2 =$ $\ln x, \text{ pentru orice } x \in G, \text{ deci } \ln f \cdot \ln 2 = 1, \text{ de unde obținem}$ $\ln f = \frac{1}{\ln 2}, \text{ deci } f = e^{\frac{1}{\ln 2}} \in G$ $e^{\frac{1}{\ln 2}} * x = 2^{\ln e^{\frac{1}{\ln 2}} \cdot \ln x} = 2^{\frac{1}{\ln 2} \cdot \ln x} = x, \text{ pentru orice } x \in G, \text{ deci } f =$ $e^{\frac{1}{\ln 2}} \text{ este elementul}$ <p>neutru al legii de compoziție „*”.</p>	3p 2p
c)	$x * \frac{1}{x} = 2^{\ln x \cdot \ln \frac{1}{x}} = 2^{-\ln^2 x}, \text{ pentru orice } x \in G$ $2^{-\ln^2 x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \ln^2 x = 1, \text{ de unde obținem } \ln x = -1 \text{ sau } \ln x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{e} \text{ sau } x = e,$ <p>care convin.</p>	2p 3p

SUBIECTUL III

1.a)	$f'(x) = x' \cdot \ln x + x \cdot (\ln x)' =$ $= \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = 1 + \ln x, x \in (0, +\infty).$	2p 3p
b)	<p>Tangenta la graficul funcției f în $M(m, f(m))$ este paralelă cu dreapta de ecuație $y = 2x \Leftrightarrow f'(m) = 2$.</p> $1 + \ln m = 2 \Rightarrow m = e, \text{ care convine.}$	3p 2p
c)	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}, f'(x) < 0, \text{ pentru orice } x \in (0, \frac{1}{e}) \Rightarrow f \text{ strict descrescător pe } (0, \frac{1}{e}) \text{ și } f'(x) > 0, \text{ pentru orice } x \in (\frac{1}{e}, +\infty) \Rightarrow f \text{ strict crescător pe } (\frac{1}{e}, +\infty), \text{ deci } f(x) \geq f(\frac{1}{e}), \text{ pentru orice } x \in (0, +\infty).$ $x \ln x \geq \frac{1}{e}, \text{ deci } x \ln x + \frac{1}{e} \geq 0, \text{ pentru orice } x \in (0, +\infty).$	2p 3p
2.a)	$\int_0^2 f(x) e^{-x} dx = \int_0^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big _0^2 = 4 - 0 = 4$	3p 2p
b)	$\int_1^e \frac{1}{x^2} f(\ln x) dx = \int_1^e \frac{1}{x} \ln^3 x dx = \frac{\ln^4 x}{4} \Big _1^e =$ $= \frac{\ln^4 e}{4} - \frac{\ln^4 1}{4} = \frac{1}{4}$	3p 2p
c)	$F(x) = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + c, c \in \mathbb{R} \text{ și, cum } F(0) = 0 \Rightarrow$ $F(x) = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + 6 \text{ deci } \int_0^1 f(x) F(x) dx = \int_0^1 F'(x) F(x) dx =$ $\frac{1}{2} F^2(x) \Big _0^1 = \frac{1}{2} (F^2(1) - F^2(0)) = 2(e - 3)^2$	2p 3p